Printed by ANNA.NGUYEN on 28 Sep 2022, at 02:49:38 pm.

PENTRON

Instructions for Use

FibreKleer-4x

Fiber Post

Pentron Clinical
3775W Collins Ave
Orange, CA 92867 USA
1-800-551-6380
pentron.com

Sybron Dental a.s.
Skalkova 208
Ústí nad Orlicí, Czech Republic
+420-465-539 111

Distributor Facility:
Kerr Australia Pty. Ltd.
Level 1, 1 Homebush
Lane Cover Road
NSW, 2066 Australia
+61 2 9805 3000

CE 2797

DMC1274_Rev.02
2022-01

©2022 Pentron Clinical. All rights reserved.

en - ENGLISH

FibreKleer®-4x
Fiber Post

GENERAL INFORMATION
FibreKleer-4x posts feature longitudinal glass fibers bundled in an even matrix designed for strength. Radiopaque and tooth-colored, FibreKleer-4x posts have tapered and cylindrical geometries — 20% aluminum to facilitate identification and radiography. Available in three body designs (parallel with a reverse taper, tapered, and original) and 3 color-coded lengths, FibreKleer-4x allows clinicians to choose the type of post that best suits each individual case.

PRODUCT COMPOSITION
Glass fiber reinforced epoxy resin based glass fiber post.

INDICATIONS FOR USE
Reinforcement of an endodontically treated tooth. Retention of core and core material.

CONTRAINDICATIONS
None Known.

WARNING:
- FibreKleer-4x posts should NOT be used in teeth with less than 2mm of sound tooth structure above the cervical bone.
- Do not use FibreKleer-4x posts with glass ionomer, zinc phosphate or polycarboxylate cement.
- FibreKleer-4x posts should be used on patients with known sensitivity to aluminum.
- FibreKleer-4x is a fiber-thick material that can deflect x-ray emissions given its aluminum content. Consider this when diagnosing.

PRECAUTIONS
- The product is intended for use by qualified dental professionals as a general pattern preparation.
- Use a rubber dam to isolate the treated tooth and avoid fluid contamination during cementation.
- Use caution when preparation above the cervical bone is unavoidable, crown lengthening or orthodontic forced eruption should be considered to allow an adequate ferrule.
- FibreKleer-4x posts are pre-silanized for increased adhesion to resin cements and core materials.
- Do not use adhesives on the core-tooth interface until the post seated within, the ferrule is in angle of the preparation should remain uncoated both interface, and on the core build-up.
- FibreKleer-4x posts must be used with a diamond bur. Do not use fiber posts with a carbide bur as this may splinter the post.
- Before cementing the selected post, prepare the FibreKleer-4x Post canal removing/shifting into the center of the post with a needle diamond or a depth of 2.5 times its diameter, then continue with the corresponding size of FibreKleer-4x Drill. It is recommended that during post removal, frequent radiographs be taken to ensure that the instruments are following the path of the post to help avoid root perforation or fracture.
- FibreKleer-4x posts can be single patient use only. This is to prevent cross contamination between patients.

ADVERSE EVENTS
If a serious incident occurs with this medical device, report to the manufacturer and to the competent authority for that country in which the user and/or patient is established.

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS
1. Isolate the treated tooth with a rubber dam.
2. Remove the gutta-percha to a depth of 4mm apex preparation based on the clinical examination and the radiological of the root canal. Test fit the tube to the apex of this section for suitable shape and size of posts and corresponding drills.
3. Select a post with a diameter that is similar to diameter of the anatomic canal at the tooth's cervical to ensure as much animal tooth structure as possible is preserved.
4. Determine the depth of the post space preparation, leaving at least 4 mm of obturation material to apex prefer at the apical end. Place rubber endodontic stop on the drill corresponding to the desired length to avoid over-preparing the post space.
5. Use the drills in a heated instrument to remove the obturation material followed by a post drill that was previously selected.
6. Using the size of FibreKleer-4x Diameter drill that matches the post to be inserted, complete the canal preparation.
7. Flush out the canal to remove any debris and dry it with an air syringe and paper points.
8. Trial seat the FibreKleer-4x post in the canal that corresponds to the size of the drill used. Ensure that the post is seated to the apex and that the post is stable. If FibreKleer-4x post is not seated or is unstable, select a smaller size drill, right-sized diameter but. Rinse the post while cutting to ensure a smooth cut. Trimming of the FibreKleer-4x post will cause fibers to be exposed. Do not cut the post with the remaining resin head. Trimmer. FibreKleer-4x tapered posts should be trimmed from the coronal end using a diamond bur or fine grit bur.
9. Clean the post with an alcohol pad or gauze with a blast of air flow and dry.
10. Cement the post using your preferred cement material according to manufacturer's instructions.

FibreKleer-4x Parts & Drills

Picture (part)	Type	Post	Drill
	Parallel	1.00 mm (red)	1.00 mm (red)
		1.25 mm (yellow)	1.25 mm(yellow)
		1.50 mm (blue)	1.50 mm (blue)
	Tapered	1.00 mm (red)	1.25 mm (black)
		1.25 mm (yellow)	1.25 mm (yellow)
		1.50 mm (blue)	1.50 mm (blue)
	Original	1.00 mm (red)*	1.00 mm (red)
		1.25 mm (yellow)	1.25 mm(yellow)
		1.50 mm (blue)	1.50 mm (blue)

*Due to size, the 1.00 mm post is not serrated

CLEANING, DISINFECTION AND STERILIZATION

REUSE/NON-INSTRUCTIONS FOR FIBERKLEER-4X POSTS
FibreKleer-4x posts must be discarded. 70% Isopropyl alcohol may be used. FibreKleer-4x disinfection, thoroughly rinse and dry the post before removing.

CLEANING AND STERILIZATION INSTRUCTIONS FOR POST DRILLS
Through cleaning is an essential pre-requisite for effective sterilization. Clean the post drills immediately after each patient use following the cleaning steps to prevent drying of soil and contaminants.

Cleaning:
1. Remove from the post drill any debris or organic matter with a 70% isopropyl alcohol disposable wipe. Wipe until no visible soil remains on the post drill.
2. Immediately place the post drill into a bath of enzymatic cleaner and follow manufacturer's instructions for a minimum of 5 minutes.
3. Immediately rinse in an ultrasonic unit in accordance with the ultrasonic unit manufacturer's instructions for a minimum of 5 minutes.
4. Rinse with water and thoroughly dry with a soft clean cloth and place in a cleaning tray. Ensure that the post drill is completely dry before packing. Use a pouch manufacturer's sterilization pouches comply with national requirements such as ISO 11607-1 and for USA use ISB-standard recommendations.

Sterilization:
1. Steam autoclave, gravity displacement: 134°C (273°F) for 18 minutes, dry for a minimum of 30 minutes. OR
2. Steam autoclave, pre-vacuum: 132°C (270°F) for 4 minutes, dry for a minimum of 30 minutes. OR Steam autoclave, pre-vacuum: 134°C (273°F) for 3 minutes.
Where the product is taken out of the autoclave, check the sterilization pouch for any damage. In case of a perforated pouch, do not use the product, as the sterilization cycle could be compromised. Do not open the product until prior sterilization procedure.
Do not place the post into the pouches containing the drill in a dry cycle that lasts more, follow the instructions provided by the pouch manufacturer regarding storage conditions and maximum allowed time in storage.

Note: The instructions provided in the section "Cleaning and Sterilization Instructions" are provided by Pentron Clinical as a validated method for cleaning and sterilizing the post drills prepping medical device for reuse. Health care facilities are responsible for making sure that the sterilization equipment is calibrated according to the manufacturer's manuals and specifications. In addition, health care facilities are responsible for making their staff are trained in correct, proper sterilization, cleaning and disinfection procedures.

STORAGE AND DISPOSAL
Keep in a dry place at room temperature (7°C to 23°C (34°F to 77°F). Allow the product to reach room temperature prior to use. The expiration date is printed on packaging. Do not use FibreKleer-4x post after expiration date. For proper disposal always follow your local and national regulations.

LIMITED WARRANTY — LIMITATION OF PARTNER'S LIABILITY
Pentron's technical advice, whether verbal or in writing, is based on experience in using Pentron's product. The dentist assumes all risk and liability for damages arising out of the improper use of Pentron's product. In the event of a defect in material or workmanship, Pentron's liability is limited, at Pentron's option, to replacement of the product or refund of the purchase price. Pentron makes no other warranty or cost of the defective product. In order to take advantage of this limited warranty, the defective product must be returned to Pentron. In no event shall Pentron be liable for any indirect, incidental, or consequential damages.
EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES, OR PROMISES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

fr - FRANCAIS (FRANCE)

FibreKleer®-4x
Tenon en fibre

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les tenons FibreKleer-4x présentent des fibres de verre longitudinales groupées dans une matrice uniforme conçue pour la résistance. Opaques et de teinte dentaire, les tenons FibreKleer-4x présentent des géométries coniques et cylindriques — 20% de l'aluminium pour faciliter l'identification sur les radiographies. Disponibles en trois corps (parallèle avec une conicité inverse, conique, et original) and 3 color-coded lengths, FibreKleer-4x allows clinicians to choose the type of post that best suits each individual case.

PRODUCT COMPOSITION
Tenon de fibre de verre renforcé à résine époxy.

INDICATIONS POUR UTILISATION
Renforcement d'une dent endodontiquement impliquée. Rétention d'une dent et de matériau de noyau.

CONTRE-INDICATIONS
Aucune connue.

AVERTISSEMENTS
- Les tenons FibreKleer-4x ne doivent PAS être utilisés sur des dents dont la structure cervicale or tissue is inexistante 2mm ou dessus de la crestal.
- Les tenons FibreKleer-4x ne doivent pas être utilisés avec un verre dans le ciment ionomère, phosphate de zinc ou polycarboxylate.
- Les tenons FibreKleer-4x doivent être utilisés sur des patients présentant une sensibilité connue au aluminium.
- Les tenons FibreKleer-4x FibreKleer-4x doivent être utilisés par anesthésie à rayons aussi utilisation. Tenir ce facteur compte lors du diagnostic.
- Les tenons FibreKleer-4x doivent être utilisés par des professionnels dentaires qualifiés à des fins de préparation de dents.
- Utilisez un barrage en caoutchouc pour isoler la dent traitée et éviter la contamination du fluide pendant le ciment.
- Si un dépassement de 2 mm de la crête osseuse est inévitable, il est conseillé de ne pas prendre, un allongement de la couronne ou une réduction orthodontique forcée doivent être envisagés pour obtenir une virole adéquate.
- Les tenons FibreKleer-4x sont pré-silanisés pour une meilleure adhérence aux ciments de résine et aux matériaux de noyau.
- Ne pas mettre des adhésifs sur l'interface tenon-dent et du tenon jusqu'à ce que le tenon ait été placé, et le tenon doit rester non revêtu sur les deux interfaces et sur le noyau.
- Les tenons FibreKleer-4x sont conçus à un seul patient. Ceci est destiné à éviter la contamination croisée entre les patients.

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
Si un incident grave survient en dispositif médical, le signaler au fabricant et à l'autorité compétente du pays dans lequel l'utilisateur et/ou le patient se trouve.

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE
1. Isolez la dent traitée à l'aide d'une digue dentaire.
2. Retirez la gutta-percha à une profondeur de 4mm apex préparer en fonction de l'examen clinique et de la radiographie de la racine. Ajustez le tube à la fin de cette section pour connaître la forme et la taille des tenons disponibles et les forets correspondants.
3. Sélectionnez un tenon avec un diamètre similaire du canal interne au niveau du cervical de la dent pour préserver la quantité de tissu dentaire animal.
4. Déterminez la profondeur de la préparation du tenon, laissez au moins 4 mm de matériau d'obturation. Maintenez un bouchon endodontique en caoutchouc sur le foret correspondant à la profondeur désirée pour éviter une surpréparation de l'espace du tenon.
5. Utiliser un instrument chauffant pour enlever le matériau d'obturation, suivi d'un premier tenon qui a été sélectionné précédemment.
6. Utilisez le foret FibreKleer-4x Diameter qui correspond au tenon pour compléter la préparation du canal.
7. Rincez le canal pour éliminer les débris et séchez-le avec une seringue à air et des pointes en papier.
8. Essayez le tenon FibreKleer-4x dans le canal correspondant à la taille du foret utilisé. Assurez-vous que le tenon est en place jusqu'à l'apex et que le tenon est stable. Si le tenon FibreKleer-4x n'est pas en place ou instable, sélectionnez un foret plus petit, mais de bon diamètre. Rincez le tenon pendant la coupe pour garantir une coupe lisse. Le rognage du tenon FibreKleer-4x exposera les fibres. Ne coupez pas le tenon avec la tête de résine restante. Les tenons FibreKleer-4x doivent être rognés du côté coronaire avec une fraise diamantée ou une fraise à grain fin.
9. Nettoyez le tenon avec un tampon d'alcool ou de gaze et un jet d'air et séchez-le.
10. Cimentez le tenon avec votre matériau de ciment préféré conformément aux instructions du fabricant.

Tenons et Forets FibreKleer-4x

Image (tenon)	Type	Tenon	Foret
	Parallèle	1,00 mm (rouge)	1,00 mm (rouge)
		1,25 mm (jaune)	1,25 mm (jaune)
		1,50 mm (bleu)	1,50 mm (bleu)
	Conique	1,00 mm (rouge)	1,25 mm (noir)
		1,25 mm (jaune)	1,25 mm (jaune)
		1,50 mm (bleu)	1,50 mm (bleu)
	Original	1,00 mm (rouge)*	1,00 mm (rouge)
		1,25 mm (jaune)	1,25 mm (jaune)
		1,50 mm (bleu)	1,50 mm (bleu)

*en raison de la taille, le tenon de 1,00 mm n'est pas dentelé

NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET STÉRILISATION

INSTRUCTIONS DE RÉUTILISATION DES TENONS FIBREKLEER-4X
Les tenons FibreKleer-4x doivent être éliminés. Du l'alcool isopropylique à 70% peut être utilisé. Désinfecter la FibreKleer-4x, rincer soigneusement et sécher le tenon à la demande.

INSTRUCTIONS DU NETTOYAGE ET DE STÉRILISATION POUR LES FORETS DE TENONS
Le nettoyage en profondeur est une condition préalable essentielle à une stérilisation efficace. Nettoyer les fraises à tenons immédiatement après chaque utilisation afin de prévenir le dessèchement du reste de nettoyage et de éliminer que les traces de salissure et les contaminants ne se développent.

Nettoyage:
1. Retirez tout débris ou matière organique du foret de tenons à l'aide d'une lingette jetable imbibée d'alcool isopropylique à 70%. Essuyez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de saleté visible sur le foret.
2. Mettez que le foret, en congestionné jet de pulvérisation, de tétrachlorure, de bain d'agitation ou de désinfection aux ultrasons après lavage hydrotraitement. Mettez en place et laissez-le pendant au moins 5 minutes.
3. Entreposé immédiatement rinsage dans un appareil à ultrasons à conformément aux instructions du fabricant de l'appareil à ultrasons pendant au moins 5 minutes.
4. Rincez à l'eau et sécher les instruments avec un chiffon doux et propre, puis les placer dans un plateau de nettoyage. Assurez-vous que le foret de tenons est sec avant emballage. Utilisez un sac de stérilisation conforme aux exigences nationales telles que la norme ISO 11607-1, et pour les utilisations aux Amériques, utilisez une norme ISB.

Stérilisation:
1. Autoclave de vapeur, déplacement de gravité: 134 °C (274 °F) pendant 18 minutes, entre pendant au moins 30 minutes. OR
2. Autoclave à vapeur, pré-vide: 132 °C (270 °F) pendant 4 minutes, entre pendant au minimum 30 minutes. OR Autoclave à vapeur, pré-vide: 134 °C (273 °F) pendant 3 minutes.
Si le produit est sorti de l'autoclave, inspecter le sac de stérilisation pour voir s'il n'est pas endommagé. En cas de sac perforé, ne pas utiliser le produit, car la stérilisation peut être compromise. Ne pas ouvrir le produit en dehors du processus de stérilisation préalable.
Ne pas placer le tenon dans les sachets contenant le foret dans un endroit sec et un cycle qui dure plus longtemps, suivez les instructions fournies par le fabricant concernant les conditions de stockage et la durée maximale de stockage autorisée.

Remarque: Les instructions fournies à la section « Instructions de nettoyage et de stérilisation » sont des validées par le laboratoire du dispositif médical comme étant valides pour nettoyer et stériliser les forets de tenons FibreKleer-4x en vue de leur réutilisation. Les établissements de soins doivent s'assurer que le matériel de stérilisation est étalonné conformément aux manuels et aux spécifications du fabricant. En plus, les établissements de soins doivent veiller à ce que leurs employés soient formés à la bonne et à la juste stérilisation, à la bonne et à la juste désinfection et à la bonne et à la juste procédure de nettoyage.

STOCKAGE ET MISE AU REBUT
Entreposer à la chaleur ambiante (entre 7 °C et 23 °C (entre 34 °F et 77 °F). Laisser le produit atteindre la température ambiante avant de l'utiliser. Le tenon FibreKleer-4x ne doit pas être utilisé après la date de péremption. Pour le rebut, toujours respecter les réglementations locales et nationales.

GARANTIE LIMITÉE — LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DU PARTENAIRE
Les conseils techniques de Pentron, oralement ou écrits, sont basés sur l'expérience dans l'utilisation du produit Pentron. Le dentiste prend le risque et assume la responsabilité de dommages résultant de l'utilisation du produit de Pentron. En cas de matériau défectueux ou de fabrication défectueuse, la responsabilité de Pentron est limitée, au choix de Pentron, au remplacement du produit ou au remboursement du prix payé. En cas de défaut, le produit défectueux doit être retourné à Pentron. Le produit défectueux doit être retourné à Pentron. Pentron ne saurait en aucun cas être responsable de dommages indirects, accidentels ou consécutifs.
À L'EXCEPTION DE CE QUI EST CLAIREMENT PRÉVU CI-DESSUS, PENTRON N'EST TENU À AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, NÉ MOTS NOTAMMENT À LA DESCRIPTION PRÉVUE, OU QUALITÉ OU DOIVENT ÊTRE ADAPTÉS À UNE FINALITÉ PARTICULIÈRE.

CONTENU
1. Tenon parallèle 2. Tenon conique 3. Tenon original 4. Foret

Pour explications complètes des symboles utilisés sur l'emballage Pentron est disponible en ligne: **http://www.pentron.com/symbols-glossary**

es - ESPAÑOL

FibreKleer®-4x
Poste de fibra

INFORMACIÓN GENERAL
Los postes FibreKleer® 4x (FibreKleer-4x) presentan fibras de vidrio longitudinales unidas en una matriz de resina uniforme para proporcionar la mayor resistencia, módulo flexural y resistencia a la fatiga. Los postes FibreKleer-4x, opacos y de color dentinario, presentan geometrías cónicas y cilíndricas — 20% de aluminio para facilitar la identificación en los radiográficos. Disponibles en tres diámetros de cuerpo (paralelo con una ligera conicidad inversa, cónico y original) y en 3 longitudes codificadas por colores, los postes FibreKleer-4x le permiten a los clínicos elegir el tipo de poste más adecuado para cada caso individual.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
FibreKleer® 4x (FibreKleer-4x) es un poste de fibra de vidrio a base de resina de epoxi reforzada.

INDICACIONES DE USO
Refuerzo de un diente tratado endodónticamente. Retención del muñón y material del muñón.

CONTRAINDICACIONES
Ninguna conocida.

ADVERTENCIAS
- Los postes FibreKleer® 4x (FibreKleer-4x) NO deben utilizarse en dientes con menos de 2 mm de estructura dental conservada por encima del hueso cervical.
- No utilice los postes FibreKleer-4x con cemento de ionómero de vidrio, fosfato de zinc o cemento de policarboxilato.
- Los Postes FibreKleer-4x deben utilizarse en pacientes con sensibilidad conocida al cinco.
- Los postes FibreKleer-4x FibreKleer-4x deben utilizarse también con rayos X. Tenga en cuenta la contribución de hierro y aluminio a la contribución.
- Los postes FibreKleer-4x deben ser utilizados por profesionales dentales cualificados a fines de preparación de dientes.
- Use un dique de goma para aislar el diente tratado y evitar la contaminación de fluidos durante el cementado.
- Si es inevitable la preparación por encima del hueso cervical, se debe considerar el alargamiento de la corona o la tracción ortodóncica forzada para obtener una ferrula adecuada.
- Los postes FibreKleer-4x están pre-silanizados para una mayor adhesión a los cementos de resina y los materiales del muñón.
- No coloque adhesivos en la interfaz del diente y el poste hasta que el poste esté asentado, la ferrula está en ángulo de preparación debe permanecer sin revestimiento en ambas interfaces, y en el muñón.
- Los postes FibreKleer-4x deben usarse con una fresa de diamante. No use postes de fibra con una fresa de carburo, ya que podría astillar el poste.
- Antes de cementar el poste seleccionado, prepare el canal del poste FibreKleer-4x Post, y también el espacio del poste FibreKleer-4x Post, y también el espacio del poste FibreKleer-4x Post, y también el espacio

Printed by ANNA.NGUYEN on 28 Sep 2022, at 02:49:38 pm

lv - LĪDZEKĻA

Fibrofoline™ 4x
Tabletēs

ĀRSTNIECĪBAS UZRĀDĪJUMI
Fibrofoline ir izstrādāts gliemežņu sekrēta un vitamīnu kombinācijai ar hamamelī balstītu ekstraktu ādas aizsardzībai. Šaitanam Fibrofoline ir ērts ārstēšanas režīms – vienas pilnas ciklā – 28 dienas ilgā ārstēšanas kursa ietvaros. Lietojot Fibrofoline (ārstēšanas kursa ietvaros), rezultāts ādas apgaismojumā ir vērojams 3 nedēļas pēc ārstēšanas sākuma. Fibrofoline ir izstrādāts šaitanādes un fibrozās ādas gadījumā ar cēloni saistītiem faktoriem, kā piemēram, ādas apgaismojumā ir vērojamas:

- Šaitanādes gadījumā – 20% ādas ir šaitanādes, ādas krāsa ādas pigmentācijas dēļ ir tāda, ka ādas krāsa ir tumšāka nekā pārējam ādas tipam;
- Fibrozās ādas gadījumā – ādas krāsa ir pelēcīga, ādai ir raksturīgs fibrozes izskats, ādas virsma ir nelīdzena, ādai ir samazinātas elastības pazīmes.

DARBĪBAS MEHĀNISMS
Gliemežņu sekrēts ir bagātīgs ar vitamīniem un minerālvielām, tas ietekmē ādas šūnu dzīves ciklu, to ātrumu un ādas šūnu struktūru. Gliemežņu sekrēts ir bagātīgs ar glikozaminoglikāniem, kas ietekmē ādas šūnu struktūru un to savstarpējo saistīšanos, tādēļ ādas šūnas ir elastīgākas un to struktūra ir vienveidīgāka. Hamamelī ir bagātīgs ar tanīniem, kas ietekmē ādas šūnu struktūru un to savstarpējo saistīšanos, tādēļ ādas šūnas ir elastīgākas un to struktūra ir vienveidīgāka. Hamamelī ir bagātīgs ar tanīniem, kas ietekmē ādas šūnu struktūru un to savstarpējo saistīšanos, tādēļ ādas šūnas ir elastīgākas un to struktūra ir vienveidīgāka.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
Ieteicamais devas apjoms ir 1 tablete dienā ēdienreizes laikā. Ārstēšanas kurss ilgums – 28 dienas. Ārstēšanas kursa laikā var lietot citus ādas kosmētiskos līdzekļus, izņēmuma gadījumā, ja ādas kairinājuma dēļ tas ir nepieciešams, ārstēšanas kurss ir jāpārtrauc.

KONTRINDIKĀCIJAS
Pārejošas kontraindikācijas ir ādas kairinājuma dēļ ādas pārejošas kontraindikācijas ir ādas kairinājuma dēļ.

ŠĀNU REAKCIJAS
Ādas kairinājuma dēļ.

ĪPAŠĪBAS
Gliemežņu sekrēts ir bagātīgs ar vitamīniem un minerālvielām, tas ietekmē ādas šūnu dzīves ciklu, to ātrumu un ādas šūnu struktūru. Gliemežņu sekrēts ir bagātīgs ar glikozaminoglikāniem, kas ietekmē ādas šūnu struktūru un to savstarpējo saistīšanos, tādēļ ādas šūnas ir elastīgākas un to struktūra ir vienveidīgāka. Hamamelī ir bagātīgs ar tanīniem, kas ietekmē ādas šūnu struktūru un to savstarpējo saistīšanos, tādēļ ādas šūnas ir elastīgākas un to struktūra ir vienveidīgāka. Hamamelī ir bagātīgs ar tanīniem, kas ietekmē ādas šūnu struktūru un to savstarpējo saistīšanos, tādēļ ādas šūnas ir elastīgākas un to struktūra ir vienveidīgāka.

**SĀNĪB

Printed by ANNA.NGUYEN on 28 Sep 2022, at 02:49:38 pm.

PENTRON

Instructions for Use

FibreKleer®-4x

Fiber Post

Pentron Clinical
1717W Collins Ave.
Orange, CA 92867 USA
1-800-101-0260
pentron.com

Sybron Dental s.r.o.
Vlachova 208
530 02 Pardubice-Cerekl Czech Republic
+420-466 540 111

Distribution Facility:
Kerr Australia Pty. Ltd.
Unit 1, 2 Lyon Park
Lane Cove West
NSW, 2066 Australia
+61 2 9955 3000

2797

DMC3274_Rev.02
2022-01

©2022 Pentron Clinical. All rights reserved.

Rx only
"Ry ooly"

EN - ENGLISH

FibreKleer®-4x
Fiberglass kołek

ZAMIERZONY CEL
FibreKleer® 4x jest kołkiem z włókna szklanego, z jaspisowym kształtem, przeznaczonym do wzmacniania i ochrony zębów martwych. Kołek ma na celu zwiększenie retencji materiału rdzeniowego w celu zwiększenia odporności na złamania. Kołek jest przeznaczony do stosowania z materiałami rdzeniowymi, takimi jak kompozyty, materiały na bazie żywic lub materiały na bazie cementu szklano-jonomerowego.

GŁÓWNA CECHA UTRZYMUJĄCA
FibreKleer® 4x ma kształt jaspisowy, co ma na celu zwiększenie retencji materiału rdzeniowego.

PRZEWIDZIANY UŻYTKOWNIK
Lekarze specjalizujący się w leczeniu zębów martwych.

PRZEWIDZIANY PACJENT
Pacjenci, którzy wymagają wzmocnienia zębów martwych.

WSKAZANIA
Kołek FibreKleer® 4x jest przeznaczony do wzmacniania zębów martwych.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u pacjentów z alergią na włókno szklane.

OSTRZEŻENIA
- Kołek FibreKleer® 4x należy stosować wyłącznie z materiałem rdzeniowym.
- Nie stosować u pacjentów z alergią na włókno szklane.
- Nie stosować u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia.
- Nie stosować u pacjentów z zaburzeniami wzrostu.
- Nie stosować u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi.
- Nie stosować u pacjentów z zaburzeniami hormonalnymi.
- Nie stosować u pacjentów z zaburzeniami immunologicznymi.
- Nie stosować u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
- Nie stosować u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi

Printed by ANNA.NGUYEN on 28 Sep 2022, at 02:49:38 pm.

- เส้นเย็บที่ดีเยี่ยม ด้วยฝีมือวิจิตรวิจิตรพิสดาร ทุกเส้นเย็บ ทำงานผ่านการตรวจสอบมาแล้วอย่างน้อยเวลาร่วม 2 วัน
- เส้นเย็บที่ดีเยี่ยม สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคขั้นสูงสุด เทคนิค
- ช่องว่างในการเย็บผ้าระหว่างเส้นเย็บ Handiwork ทั้งหมดมีความสม่ำเสมอกันอย่างสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นเส้นตรง เส้นคดโค้งเล็กน้อย หรือเส้นโค้ง ที่ประณีตวิจิตรพิสดาร
- ไม่มีเศษวัสดุใดๆ ติดค้างอยู่ด้านหลังเส้นเย็บ Handiwork ทั้งหมด ทั้งเส้นตรงและเส้นโค้ง ไม่ว่าจะเป็นเส้นตรง เส้นคดโค้งเล็กน้อย หรือเส้นโค้ง ที่ประณีตวิจิตรพิสดาร
- สฤกษ์งามยามดี Handiwork หรือ Handiwork ส่งผลออกมาอย่างเป็นเอกภาพ ราวกับมีใครสลักสรรค์ขึ้นมาด้วยฝีมือ